

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Gebrauchsinformation

# Panthenol-Augensalbe JENAPHARM®

Wirkstoff: Dexpanthenol

### Zusammensetzung

1 g Augensalbe enthält:

- **arzneilich-wirksamer Bestandteil**  
Dexpanthenol 50 mg
- sonstige Bestandteile  
Dickflüssiges Paraffin, Weißes Vaselin

### Darreichungsform und Packungsgröße

Augensalbe

Packung mit 1 Tube zu 5 g Augensalbe N 1

### Stoff- oder Indikationsgruppe oder Wirkungsweise

Mittel zur Wundheilungsförderung an der Bindehaut und Hornhaut des Auges

### Pharmazeutischer Unternehmer:

**mibe** Vertriebsgesellschaft mbH  
Otto-Schott-Straße 15  
07745 Jena  
Telefon (03641) 648 0  
Telefax (03641) 648 180

### Hersteller:

**mibe** GmbH Arzneimittel  
Münchener Straße 15  
06796 Brehna

### Anwendungsgebiete

- Zur unterstützenden Behandlung der Heilung von Hautläsionen der Binde- und Hornhaut des Auges
- zur symptomatischen Behandlung von Austrocknungserscheinungen der Binde- und Hornhaut

### Hinweis:

**Panthenol-Augensalbe JENAPHARM®** ist nicht geeignet zur Heilung infektiöser Binde- und Hornhautprozesse bakterieller, viraler oder mykotischer Genese, sondern nur als unterstützendes Mittel zu einer spezifischen Behandlung.

### Gegenanzeigen

*Wann dürfen Sie Panthenol-Augensalbe JENAPHARM® nicht anwenden?*

**Panthenol-Augensalbe JENAPHARM®** darf bei Überempfindlichkeit gegen Dexpanthenol oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels nicht angewendet werden.

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Bei fachgerechter Anwendung kann **Panthenol-Augensalbe JENAPHARM®** während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Allerdings sollten nicht mehr als 6 mg Dexpanthenol (1 cm Salbenstrang entspricht 1 mg Dexpanthenol) täglich angewandt werden.



### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

*Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?*

Während der Anwendung von **Panthenol-Augensalbe JENAPHARM®** dürfen keine Kontaktlinsen getragen werden.

*Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit mit Maschinen und bei Arbeiten ohne sicheren Halt beachten?*

Unmittelbar nach Anwendung der Augensalbe kann durch Schleiersehen die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr, zur Arbeit ohne sicheren Halt oder zum Bedienen von Maschinen zeitweilig beeinträchtigt sein.

In dieser Zeit sollten daher keine Maschinen bedient, nicht ohne sicheren Halt gearbeitet und nicht am Straßenverkehr teilgenommen werden.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt **Panthenol-Augensalbe JENAPHARM®** nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da **Panthenol-Augensalbe JENAPHARM®** sonst nicht richtig wirken kann.

### Wie viel und wie oft sollten Sie Panthenol-Augensalbe JENAPHARM® anwenden?

Ein etwa 1 cm langer Salbenstrang (entsprechend ca. 1 mg Dexpanthenol) ist 3- bis 4-mal täglich in den unteren Bindehautsack des erkrankten Auges einzubringen. Zur Vorbeugung bei rezidivierenden Hornhauterosionen wird die Augensalbe nur zur Nacht eingestrichen.

### Wie sollten Sie Panthenol-Augensalbe JENAPHARM® anwenden?

Die Augensalbe sollte bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden, damit sie geschmeidig ist und besser aus der Tube austreten kann.


Bitte entnehmen Sie die Augensalbe durch sanftes Ausdrücken der Tube ohne Knicken und Aufrollen.

### Einbringen in den Bindehautsack

Die Tube zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und vorsichtig dem Auge nähern, Kopf leicht nach hinten neigen, Blick nach oben richten und mit dem Zeigefinger das Unterlid wegziehen.



Die verordnete Menge Augensalbe in den Bindehautsack des erkrankten Auges einbringen, ohne dass die Tubenspitze mit dem Auge oder Lidrand in Berührung kommt.



Der Salbenstrang soll nach dem Einbringen durch mehrere Lidschläge und Bewegungen des Augapfels gleichmäßig verteilt werden.

### Wie lange sollten Sie **Panthenol-Augensalbe JENAPHARM®** anwenden?

Je nach Ausprägung des Krankheitsbildes und des Krankheitsverlaufes wird Ihr Arzt die Dauer der Behandlung festlegen.

### Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was ist zu tun, wenn **Panthenol-Augensalbe JENAPHARM®** in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Aufgrund des begrenzten Aufnahmevermögens des Bindehautsacks ist eine Überdosierung mit **Panthenol-Augensalbe JENAPHARM®** praktisch ausgeschlossen.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig **Panthenol-Augensalbe JENAPHARM®** angewendet haben oder eine Anwendung vergessen haben?

Es ist wichtig, dass **Panthenol-Augensalbe JENAPHARM®** regelmäßig angewendet wird. Wenn Sie es aber doch einmal oder öfter vergessen, setzen Sie die Behandlung wie verordnet fort.

### Nebenwirkungen

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

sehr häufig:	mehr als 1 von	10 Behandelten	
häufig:	weniger als 1 von	10, aber mehr als 1 von	100 Behandelten
gelegentlich:	weniger als 1 von	100, aber mehr als 1 von	1000 Behandelten
seltener:	weniger als 1 von	1000, aber mehr als 1 von	10.000 Behandelten
sehr selten:	weniger als 1 von	10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle	

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von **Panthenol-Augensalbe JENAPHARM®** auftreten?

Sehr selten können allergische Unverträglichkeitserscheinungen auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf dem Tubenfalz und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie den Inhalt dieser Packung nicht mehr nach Ablauf dieses Datums!

### Haltbarkeit nach Öffnen der Tube

Nach Anbruch 4 Wochen verwendbar.

Wie ist **Panthenol-Augensalbe JENAPHARM®** aufzubewahren?

Nicht über 25 °C lagern!

Achten Sie stets darauf, dieses Arzneimittel so aufzubewahren, dass es für Kinder nicht zu erreichen ist.

### Stand der Information

Juni 2005